



AGRIVET

WHEN HEALTH MATTERS ■■■

SMARTRACE® RUMICALC

DIETETIC COMPLEMENTARY FEED FOR THE REDUCTION OF THE RISK OF MILK FEVER IN DAIRY COWS

SUSTAINED RELEASE BOLUSES

AANVULLEND DIEETVOEDER VOOR DE VERMINDERING VAN HET RISICO OP MELKZIEKTE BIJ MELKKOEIEN

BOLUSSEN MET GELEIDELIJKE AFGIFTE

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE DIÉTÉTIQUE POUR LA RÉDUCTION DU RISQUE DE FIÈVRE DU LAIT CHEZ LES VACHES LAITIÈRES

BOLUS À LIBÉRATION PROGRESSIVE

INTRODUCTIE

SMARTRACE® RUMICALC bolussen zijn een oraal calciumsupplement voor melkkoeien bij het afkalven. **SMARTRACE® RUMICALC** bolussen kunnen ook worden gebruikt als aanvullende supplement voor melkkoeien die door injectie, om ervoor te zorgen dat de koe langer calcium toegedient krijgt.

Het wordt aanbevolen om voor gebruik advies in te winnen van een voedingsdeskundige. **SMARTRACE® RUMICALC** bolussen zijn bedoeld voor volwassen melkkoeien met een levend gewicht van meer dan 400 kg.

Na toedeling van **SMARTRACE® RUMICALC bolussen lost de coating op delbolus op in de pers en valt de bolus binnen 50 minuten volledig uiteen. Het calciumchloride wordt snel geabsorbeerd en het calciumsulfaat wordt over een langere periode geabsorbeerd, waardoor een langdurige calciumvoorziening wordt verkregen.**

Pre- en postkalvening regime: Dien één bolus toe bij de eerste tekenen van afkalven. Dien 12-15 uur na de eerste bolus een tweede bolus toe.

Regime na het afkalven: Dien één bolus toe onmiddellijk na het afkalven (of na een ondervluijs calciuminjektie). Dien 12-15 uur na de eerste bolus een tweede bolus toe. Gebruik alleen een goedgekeurde bolusapplicator.

Post Calving Regime: Administer one bolus immediately after calving (or after sub-cutaneous calcium injection). Administer a second bolus 12-15 hours after the first bolus. Use only approved bolus applicator.

ADMINISTRATIE

1 Insert the FLAT end of the bolus into the head of the applicator so that the DOMED end of the bolus will enter the animal's mouth first.

2 Insert the applicator into the animal's mouth.

Keep the neck straight.

Insert the applicator carefully from the front of the mouth (not the side) and over the back of the tongue.

X DO NOT use severe restraints such as gripping the tongue, or holding the head too high.

X If you are using a crush, be sure the 'V' of the gate does not press against the throat. This interferes with swallowing.

3 Release

As the animal begins to swallow, gently eject the bolus.

X DO NOT push the bolus applicator too far down the throat.

X DO NOT use force as you may damage the animal's throat.

Take care and time.

TOEDIENING

1 Steek het PLATTE uiteinde van de bolus in de kop van de applicator zodat het BOLLE uiteinde van de bolus eerst in de bek van het dier terechtkomt.

2 Breng de applicator in de bek van het dier.

Houd het dier vast met de hand in de voorwaartse positie.

Houd de nek recht.

Plaats de applicator voorzichtig vanaf de vooruit van de bek (naar de zijkant) en over de achterkant van de tong.

X Gebruik **GEEN** enige dwangmaatregelen zoals het vastrukken van de tong of het houden van de kop.

X Als u een haksophok gebruikt, zorg er dan voor dat de 'V' van het helse niet tegen de keel drukt. Dit belemmert het slikken.

3 Loslaten

Als het dier begint te slikken, werp de bolus dan voorzichtig uit.

Duw de bolusapplicator **NET** te ver in de keel.

Gebukt **GEN** kracht, dan kan de keel van het dier beschadigen.

Wees voorzichtig en neem de **tijd**.

PRESENTATION

Each 203 g bolus contains 43 g of calcium. Intended for use in adult dairy cows, over 400 kg liveweight, at calving.

WARNINGS

SMARTRACE® RUMICALC boluses must not be given to cows with clinical signs of milk fever as the swallowing reflex may be impaired. Do not give to downer cows. If the coating on the bolus becomes damaged or breaks off do not administer the bolus.

Regime de pré et post-vélage: Administre un bolus au premier signe de vélage. Administre un second bolus 12 à 15 heures après le premier bolus.

Regime post-vélage: Administre un bolus immédiatement après le vélage (ou après une injection sous-cutanée de calcium). Administre un second bolus 12 à 15 heures après le premier bolus. N'utilisez que l'applicateur de bolus approuvé.

STORAGE

Store in a cool, dry place below 25 °C. Store in the sealed, plastic containers until immediately prior to administration.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

COMPOSITION

56 %

CALCIUM CHLORIDE (E509)

23 %

CALCIUM SULFATE (E516)

21 %

OTHER INGREDIENTS: WAX COATING (E484), WATER

INHOUD

Elke bolus van 203 g bevat 43 g calcium. Elke verpakking bevat 3 x 4 bolussen. Bestemd voor gebruik bij volwassen melkkoeien, van meer dan 400 kg bij het afkalven.

WAARSCHUWINGEN

SMARTRACE® RUMICALC mag niet worden toegediend aan koeien met klinische tekenen van melkkoeien, omdat de slikreflex verstoord kan zijn. Niet toedienen aan koeien met een lang melkkoeienvolume. Als de coating van de bolus beschadigt of is afbrekelt, mag de bolus niet worden toegediend.

BEWAREN

Bewaren op een koel, droge plaats beneden 25 °C. Bewaren in de gesloten, plastic verpakking tot vlak voor toediening.

WAARDE BEREIK VAN KINDEREN BEWAAREN

SAMENSTELLING

56 %

CALCIUMCHLORIDE (E509)

23 %

CALCIUMSULFAAT (E516)

21 %

ANDERE INGREDIËNTEN: ENDUIT DE CIRE (E484), EAU

PRESSENTATION

Chaque bolus de 203 g contient 43 g de calcium. Chaque paquet contient 3 x 4 bolus. Destiné à être administré aux vaches par la route. car le réflexe de déglutition peut être altéré. Ne pas administrer aux vaches déprimées. Si l'enveloppe du bolus est endommagée ou se détache, ne pas administrer le bolus.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et sec, à moins de 25 °C. Conserver dans les récipients en plastique scellés jusqu'au moment de l'administration.

AVERTISSEMENTS

Les bolus **SMARTRACE® RUMICALC** ne doivent pas être administrés aux vaches présentant des signes cliniques de fièvre viraïale, car le réflexe de déglutition peut être altéré. Ne pas administrer aux vaches déprimées. Si l'enveloppe du bolus est endommagée ou se détache, ne pas administrer le bolus.

PRÉSENTATION

Chaque bolus de calcium (E509).....

56 %

Chaque bolus de sulfate de calcium (E516).....

23 %

Autres ingrédients: huile de cire (E484), eau.....

COMPOSITION

56 %

CHLORURE DE CALCIUM (E509).....

23 %

SULFATE DE CALCIUM (E516).....

21 %

Autres ingrédients: huile de cire (E484), eau.....

COMPOSITION

56 %

CHLORURE DE CALCIUM (E509).....

23 %

SULFATE DE CALCIUM (E516).....

23 %

Autres ingrédients: huile de cire (E484), eau.....

COMPOSITION

56 %

CHLORURE DE CALCIUM (E509).....

23 %

SULFATE DE CALCIUM (E516).....

21 %

Autres ingrédients: huile de cire (E484), eau.....

COMPOSITION